

Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS)

Boletim Comunitário de Abastecimento de Medicamentos

Falsificação de Benzodiazepina

- No período de novembro de 2020 a maio de 2021, múltiplas pílulas previstas para serem benzodiazepinas (Xanax, "Xanny bars", "footballs") foram confirmadas como sendo benzodiazepinas falsificadas (n=23). Tais pílulas continham benzodiazepinas que não são aprovadas pelo FDA ou vendidas nos EUA ou benzodiazepinas sintéticas, incluindo etizolam, bromazolam, clonazolam e flualprazolam. As amostras foram encontradas em 4 comunidades MA (Boston, Quincy, Gloucester, Lynn) sendo que a maioria das amostras foram enviadas de Boston. Todas as amostras foram coletadas em colaboração com programas locais de redução de danos ou doadas por departamentos policiais e submetidas a testes MADDS.
- Amostras das pílulas continham benzodiazepinas e cortes inativos; uma amostra tinha detectado vestígios de fentanil.
- As benzodiazepinas que não são aprovadas ou vendidas pela FDA nos EUA, como a etizolam, não são prescritas ou monitoradas quanto à qualidade e, assim, não são consideradas seguras. Os benzodiazepínicos projetados não são aprovados para uso médico em qualquer parte do mundo.
- Um pequeno número de relatos de experiência de usuários observou efeitos negativos à saúde: "desmaios", "dores no peito" e três overdoses. Dois usuários expressaram que a substância era mais fraca do que o esperado. A experiência do usuário incluiu efeitos desejados, tais como redução da ansiedade e auxílio ao sono semelhantes a outros benzodiazepínicos, mas com efeitos mais duradouros (6-24 horas), um tempo mais rápido para a tolerância e sintomas de abstinência mais desafiadores que podem durar dias a um mês.

Como Identificar o Medicamento

- Não é fácil dizer que um comprimido é uma Benzodiazepina falsificada sem testes analíticos. Xanax (alprazolam) são tipicamente comprimidos em forma de barra verde, amarela ou azul com impressões de números e letras, mas os benzodiazepínicos falsificados podem ter o mesmo aspecto. As falsificações podem se desfazer facilmente ou ficar descoloridas em sua mão ou na embalagem do medicamento.
- Se você tiver suspeitas sobre a composição de seus medicamentos, entre em contato com o MADDS sobre a verificação de medicamentos.

Clique aqui [para mais informações e recursos](#) ou [escaneamento](#)



Efeitos à Saúde

- Para todos os benzodiazepínicos - reais ou falsificados - este risco de overdose é agravado pela co-exposição a outros medicamentos sedativos como o álcool e opiáceos, incluindo os utilizados para tratamento de dor ou dependência. Todos os benzodiazepínicos podem produzir sedação intensa, parar ou retardar a respiração e/ou perda de consciência.
- Caso esteja preocupado sobre o que está em uma amostra de medicamento, entre em contato com uma organização comunitária local de redução de danos para obter conselhos adicionais sobre uso mais seguro e disponibilidade de verificação de medicamentos com o MADDS.

Redução de Riscos e Prevenção de Overdose

- Caso você obtenha comprimidos fora de uma farmácia, use uma fita de teste de fentanil para verificar se ela contém fentanil. Os comprimidos falsificados de benzo-diazepina darão negativo nas fitas de teste de fentanil, exceto se houver um nível detectável de fentanil nelas. As pílulas que são falsificadas podem não ser misturadas uniformemente, portanto testar uma pílula pulverizada ou mais de uma parte da pílula é a melhor opção.
- Narcan (naloxona) reverte as overdoses envolvendo opióides. Não reverterá a sedação de uma benzodiazepina.
- O fornecimento de medicamentos é imprevisível. Torna-se mais seguro utilizá-lo quando outras pessoas estão presentes e pode verificar com frequência. As pessoas que usam em conjunto devem se revezar para evitar overdose simultânea. Administre Narcan e peça ajuda em caso de overdose ou outras reações adversas. Você pode obter Narcan em [programas de redução de danos](#) e [farmácias de varejo](#) sem receita médica.
- Tome cuidado ao usar benzodiazepinas. Se você acha que é falsificado, tome doses menores.
- Observe a ordem de quando você usa benzodiazepinas. O consumo deles após opióides ou álcool pode aumentar a depressão respiratória.
- O uso de benzodiazepínicos falsificados em uma superdosagem pode ser imprevisível e não atingir os efeitos esperados.

MADDS é uma colaboração financiada pelo estado entre pesquisadores da Universidade Brandeis, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, diversos departamentos de polícia municipal e agências locais de redução de danos. Entre em contato conosco pelo e-mail maddsbrandeis@gmail.com.