

Massachusetts Drug Supply Data Stream (MADDS)

Boletín de Suministro de Drogas a la Comunidad

Falsificación de Benzodiazepinas

- Desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021, se ha confirmado que varias píldoras que se espera sean benzodiazepinas (Xanax, "barras Xanny", "balones de fútbol") son benzodiazepinas falsificadas (n = 23). Estas píldoras contenían benzodiazepinas que no están aprobadas por la FDA ni se venden en los Estados Unidos o benzodiazepinas sintéticas de "diseño", incluidos etizolam, bromazolam, clonazolam y flualprazolam. A veces se denominan sustancias químicas de investigación (CR). Las muestras se encontraron en 4 comunidades de Massachusetts (Boston, Quincy, Gloucester, Lynn) con la mayoría de las presentaciones provenientes de Boston. Todas las muestras fueron recolectadas en colaboración con programas locales de reducción de daños o donadas por departamentos de policía y enviadas para pruebas MADDS.
- Las muestras de píldoras contenían benzodiazepinas y cortes inactivos; en una muestra se detectaron trazas de fentanilo
- Las benzodiazepinas que no están aprobadas por la FDA o no se venden en los EE.UU., como el etizolam, no se recetan ni se controlan para determinar su calidad y por lo tanto no se consideran seguros. Las benzodiazepinas de diseño no están aprobadas para uso médico en ninguna parte del mundo.
- Algunos informes sobre la experiencia de usuarios señalaron efectos negativos para la salud: "lo dejó inconsciente", "tuvo fuertes dolores en el pecho" y tres sobredosis. Dos usuarios expresaron que la sustancia era más débil de lo esperado. La experiencia de usuario incluyó los efectos deseados como la reducción de la ansiedad y la ayuda para dormir similar a otras benzodiazepinas, pero con efectos más duraderos (6-24 horas), un tiempo de tolerancia más rápido y síntomas de abstinencia más desafiantes que pueden durar de días a un mes.

Cómo identificar la droga

- Es difícil saber que una pastilla es una benzodiazepina sintética sin una prueba analítica. Xanax (alprazolam) son típicamente pastillas verdes, amarillas o azules en forma de barra con impresiones de números y letras, pero las benzodiazepinas falsificadas pueden tener el mismo aspecto. Las falsificaciones pueden desmoronarse con facilidad o decolorarse en su mano o en el empaque del medicamento.
- Si tiene sospechas sobre la composición de sus medicamentos, comuníquese con MADDS acerca de la verificación de medicamentos.

Click [para más información](#) y recursos o escanee



Efectos en la salud

- Para todas las benzodiazepinas, reales o falsificadas, este riesgo de sobredosis aumenta con la exposición conjunta a otros medicamentos sedantes como el alcohol y los opioides, incluidos los que se usan para el tratamiento del dolor o la adicción. Todas las benzodiazepinas pueden producir sedación intensa, detener o disminuir la respiración y / o pérdida del conocimiento.
- Si le preocupa lo que hay en una muestra de medicamento, comuníquese con una organización comunitaria local de reducción de daños para obtener asesoramiento adicional sobre el uso más seguro y la disponibilidad de la verificación de medicamentos con MADDS.

Reducción de Daños y Prevención de Sobredosis

- Si compra píldoras fuera de una farmacia, use una tira reactiva de fentanilo para verificar si contiene fentanilo. Las píldoras de benzodiazepinas falsificadas darán negativo en las tiras reactivas de fentanilo a menos que haya un nivel detectable de fentanilo en ella. Es posible que las píldoras falsificadas no se mezclen de manera uniforme, por lo que es mejor probar una píldora pulverizada o más de una parte de la píldora.
- Narcan (naloxona) revierte las sobredosis que involucran opioides. No revertirá la sedación de una benzodiazepina.
- El suministro de medicamentos es impredecible. Es más seguro utilizarlo cuando hay otras personas presentes y pueden controlarlo frecuentemente. Las personas que lo usan juntas deben turnarse para evitar una sobredosis simultánea. Administre Narcan y solicite ayuda en caso de sobredosis u otra reacción adversa. Puede obtener Narcan en programas de reducción de daños y farmacias minoristas sin la necesidad de una receta.
- Tómelo con calma cuando use benzodiazepinas. Si cree que es falso, tómelo aún más despacio con dosis más pequeñas.
- Observe el orden de uso de las benzodiazepinas. Tomarlos después de los opioides o el alcohol puede aumentar la depresión respiratoria.
- El uso de benzodiazepinas falsificadas de modo exagerado/sobredosis estimulante puede ser impredecible y puede tener como consecuencia un descenso no deseado.