



Dados de Fornecimento de Drogas de Massachusetts (MADDS)

Atualização de Narcóticos de Rua: Metanfetamina

A metanfetamina está aumentando em Massachusetts

- De janeiro de 2021 a junho de 2022, a metanfetamina foi detectada em 77 de 1357 (6%) amostras de drogas testadas pelo MADDS.*
- As anfetaminas são estimulantes que focalizam a atenção, eliminam a fadiga, diminuem o apetite, elevam o humor e causam euforia. A metanfetamina é uma anfetamina de ação mais rápida que as anfetaminas de prescrição comum, como Adderall.

A metanfetamina é um perigo para a saúde.

- Os efeitos do uso de metanfetaminas incluem ritmo cardíaco anormal, aumento do ritmo cardíaco e da pressão arterial, lesão renal, alucinações, psicose, paranoia e agressão.
- A cafeína é um ativo comum para metanfetamina devido a seu efeito estimulante e aparência similar. Em altas doses, a cafeína pode causar ritmos cardíacos anormais, baixos níveis de potássio e convulsões, o que pode levar à parada cardíaca e à morte.
- Tomar muito de um estimulante como a metanfetamina é chamado de "overamping" e pode levar ao superaquecimento, ataque cardíaco, convulsão ou derrame.
- A combinação de fentanil ou outros opióides com metanfetamina (chamada "goofballing") aumenta o risco de overdose.
- O fentanil às vezes foi encontrado em/vendido como metanfetamina, mas a metanfetamina também tem sido encontrada inesperadamente em fentanil. O fentanil pode levar a uma overdose, metanfetamina pode levar a riscos à saúde como os citados acima.

Como responder:

- **Procure atendimento médico.** Monitore a hidratação e a temperatura corporal e procure sinais de um derrame, convulsão ou ataque cardíaco.
- Quando uma pessoa parece estar passando por uma crise de saúde mental como a psicose, tente **mantê-los calmos** enquanto você chama por atendimento médico.
- Ao realizar atividades de alcance comunitário, distribua água, suprimentos de uso mais seguro e naloxona, mesmo para pessoas que não misturam metanfetaminas com opióides.
- No caso de uma suspeita de overdose de opióides, **administre naloxona** (por exemplo, Narcan) e **chame por ajuda!**

Como o fornecimento de metanfetaminas está impregnado com fentanil e outros opióides, mesmo as pessoas que não misturam metanfetaminas com o uso de opióides podem estar em risco de overdose de opióides. Portanto, é importante que todas as pessoas que usam metanfetaminas tenham acesso à naloxona.

Como identificar a metanfetamina

- A metanfetamina aparece frequentemente como um sólido cristalino branco, um cristal transparente, ou um pó ou comprimido branco de sabor amargo (veja as fotos)



Exemplos de amostras de metanfetaminas coletadas pelo MADDS

As pessoas que sofrem alucinações, paranoia ou outros sintomas de psicose devido ao uso de metanfetaminas podem tornar-se agressivas se se sentirem ameaçadas. A abordagem destas situações diminui calmamente a probabilidade de que a violência venha a ocorrer.

* MADDS é uma colaboração financiada pelo estado entre pesquisadores da Universidade de Brandeis, o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, vários departamentos de polícia municipal e agências locais de redução de danos. Entre em contato conosco em maddsbrandeis@gmail.com, digitalize o código QR, ou [clique aqui](#) para mais informações.

