



Incremento de Xilacina en fentanilo & heroína (droga)

- El sedante veterinario xilacina se ha encontrado cada vez más en las muestras de drogas en Massachusetts. *
- **Xilacina es un tranquilizante de acción prolongada, pero no es un opiode.** Algunas muestras tenían tanta xilacina como droga o más xilacina que droga.

El estado de inconsciencia causado por la xilacina puede parecer una sobredosis de opiodes, pero no responderá a naloxona. Si alguien está respirando, pero no responde cuando intenta despertarlo, **controle su respiración para asegurarse de que esté recibiendo suficiente oxígeno. Provea naloxona, comience con las respiraciones de rescate, y solicite ayuda** si su respiración es ronca o su piel se encuentra cenicienta o pálida.


La Xilacina es un peligro para la salud

Xilacina puede conducir a

- **Cansancio extremo**
- **Inconsciencia por largos períodos de tiempo**
- **Descenso del ritmo cardíaco**
- **Una alta probabilidad de sobredosis o muerte** si se utiliza con droga y otros tranquilizantes
- **Llagas e infecciones graves**, incluso en lugares de su cuerpo alejados de donde se ha inyectado
- **Lesión grave** si queda inconsciente y permanece en una posición por demasiado tiempo
- **Sufrir demasiado calor o demasiado frío** si se descompensa estando al aire libre

Algunas personas que enviaron muestras con xilacina dijeron que "me hizo dormir raro"; "quedé inconsciente por seis horas"; "me hizo desmayar y me desperté con vómito encima"; y "la piel en llamas, sentía que los dientes se me fueran a caer."

Cómo la xilacina puede afectar su piel



Úlceras

Sarpullido

Necrosis

Pus



La Xilacina ha sido encontrada en el polvo de drogas callejeras y en analgésicos falsos.

Reducción de daños y riesgo de sobredosis

- **CONSUMA CON O ALREDEDOR DE OTRAS PERSONAS.** Las personas que consumen juntas deben turnarse para no tener una sobredosis al mismo tiempo.
- Si alguien sufre una sobredosis, **SOLICITE AYUDA Y SUMINISTRE NALOXONA** hasta que comience a respirar regularmente, incluso si sigue inconsciente. Si alguien está inconsciente, pero continúa respirando, colóquelo en la posición de recuperación (debajo) y controle su respiración.



Si alguien se desmaya luego de haber estado consumiendo, pero continúa respirando, **colóquelo en la posición de recuperación**, como se muestra aquí, y **solicite ayuda!**

- **UTILICE JERINGAS ESTERILIZADAS** y limpie su piel cada vez que se inyecte para prevenir infecciones. Controle los lugares donde se inyecta y otras heridas. Busque ayuda médica si la herida se pone roja/hinchada o si tiene fiebre.
- Es difícil saber qué contienen las drogas callejeras. **Consulte con su programa local de reducción de daños** sobre naloxona, ayuda y kits para el cuidado de heridas, suministros para un uso más seguro, asesoramiento y control de medicamentos con MADDS.



MADDS es una colaboración financiada por el estado con investigadores de la Universidad de Brandeis, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, varios departamentos de policía de la ciudad y agencias locales de reducción de daños. [Cliquee aquí](#), escanee el código QR, o envíenos un correo a maddsbrandeis@gmail.com para más información.