



Dòng Thông Tin Nguồn Cung Thuốc Của Massachusetts (MADDS) Cảnh Báo Về Ma Túy Đường Phố: Xylazine

Xylazine đang gia tăng trong nhóm fentanyl & heroin (chất ma túy)

- Thuốc xylazine có tác dụng giảm đau cho động vật được tìm thấy ngày càng nhiều trong các mẫu ma túy rải rác ở khắp Massachusetts.*
- **Xylazine là loại thuốc an thần có hoạt lực kéo dài nhưng nó không phải là một loại thuốc opioid.** Một số mẫu có nồng độ xylazine tương đương với nồng độ ma túy hoặc có nồng độ xylazine nhiều hơn nồng độ ma túy.

Ngất đi do xylazine có thể giống như bị quá liều opioid, nhưng nó sẽ không tạo phản ứng khi sử dụng naloxone. Nếu có ai đó vẫn còn thở nhưng không tỉnh dậy khi bạn cố gắng đánh thức họ, hãy theo dõi hơi thở của họ nhằm đảm bảo họ vẫn đang có đủ khí oxy. Cho uống naloxone, bắt đầu cấp cứu hơi thở và gọi cấp cứu nếu họ thở gập hoặc da chuyển sắc xanh xao tái nhợt.



Xylazine đã được tìm thấy trong bột ma túy trên đường phố và trong các loại thuốc giảm đau giả.

Giảm thiểu tác hại và nguy cơ dẫn đến sốc thuốc


Xylazine vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe

Xylazine có thể dẫn đến

- **Chứng buồn ngủ cực độ**
- **Bất tỉnh trong khoảng thời gian dài**
- **Nhịp tim chậm hơn rất nhiều**
- **Nguy cơ sốc thuốc hoặc tử vong** nếu dùng chung với ma túy và các loại thuốc giảm đau khác
- **Lở loét và nhiễm trùng nặng**, ngay cả trên các vùng cơ thể không tiêm chích
- **Bị thương nghiêm trọng** nếu bất tỉnh và nằm ở một tư thế quá lâu
- **Rơi vào trạng thái quá nóng hoặc quá lạnh** nếu vô tình ngất đi ở ngoài trời

Một số người đã báo cáo tình trạng của họ có liên quan đến xylazine như sau “khiến tôi ngủ một cách bất thường”; “tôi bị ngất suốt 6 tiếng”; “khiến tôi bất tỉnh và rồi khi tỉnh dậy thì tôi nhận thấy có bãi ối trên người”; “da như bị cháy, răng cảm giác như sắp bị rụng hết.”

Xylazine gây ảnh hưởng lên da



Loét da

Phát ban


Da hoại tử

Mủ

- **DÙNG CHUNG HOẶC LUÂN PHIÊN VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.**

Những người dùng chung nên thay phiên để tránh bị sốc thuốc cùng một lúc.

- Nếu có người sốc thuốc, **HÃY KÊU CỨU VÀ CHO HỌ UỐNG NALOXONE** cho tới khi họ bắt đầu thở lại bình thường, ngay cả khi họ vẫn còn đang bất tỉnh. Nếu có ai đó đã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở, hay đặt họ trong tư thế phục hồi (như bên dưới) và theo dõi hơi thở của họ.



Nếu có người ngất đi sau khi sử dụng nhưng vẫn còn thở, hãy đặt họ ở tư thế phục hồi, như hình này và gọi cấp cứu!

- **SỬ DỤNG KIM TIÊM TIỆT TRÙNG** và làm sạch da mỗi khi tiêm để tránh bị nhiễm trùng. Theo dõi các vùng tiêm và những chỗ bị loét. Tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt y tế nếu chỗ loét sưng/đỏ hoặc nếu bạn bị sốt.
- Thật khó để xác định được các thành phần có trong thuốc phiện đường phố. **Hãy tham gia chương trình giảm tổn thương tại địa phương của bạn** để được nhận naloxone, trợ giúp chăm sóc vết thương, bộ dụng cụ chăm sóc vết thương, nguồn cung an toàn hơn, lời khuyên và kiểm tra ma túy với MADDS.



MADDS là chương trình được tài trợ, có sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Brandeis, Sở Y Tế Công Massachusetts, các sở cảnh sát thị trấn khác nhau. [Nhấp vào đây](#), quét mã QR, hoặc gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ maddsbrandeis@gmail.com để biết thêm chi tiết.