




Abastecimento de Drogas em Massachusetts (MADDS)

Alerta de Fornecimento Comunitário de Drogas:

Xilazina Presente em Opióides Julho 2022

Xilazina está aumentando em fentanil e heroína

- Desde o relatório inicial do MADDS em março de 2021, o sedativo veterinário xilazina continua a ser detectado em um número substancial de amostras vendidas como fentanil e heroína em todo o estado de Massachusetts.* Em 2021, 31% das 398 amostras de opióides que foram testadas em todo o estado continham xilazina. Em 15 de junho, esta mesma substância foi detectada em 28% das 263 amostras de opióides testadas em 2022 (veja o gráfico).



- La mayoría de las muestras con xilacina, contenían fentanilo y fueron vendidas como droga/heroína. La cantidad de xilacina encontrada en las muestras vendidas como droga/heroína variaban, pero un número cada vez mayor contenía xilacina como el mayor componente.
- Las muestras analizadas desde enero al 15 de junio de 2022, muestran que la xilacina es más frecuentemente encontrada en drogas vendidas como heroína/droga/fentanilo en las áreas del oeste de Massachusetts más que en el este. (42% vs. 21% de muestras de opioides).
- Las muestras que contienen xilacina incluyen analgésicos falsificados, polvo residual marrón y blanco en bolsas, y elementos de cocina de droga y algodones utilizados para su inyección.
- En 2021, en 7 de las 131 muestras que contenían xilacina (5%) fueron asociadas a sobredosis fatales o no fatales donde además estaba involucrado el fentanilo.

A xilazina está geralmente presente nos opióides. A xilazina pode contribuir para a super-sedação juntamente com os opióides. A naloxona NÃO IRÁ reverter os efeitos da xilazina, mas SEMPRE administre naloxona em caso de suspeita de overdose. A naloxona reverterá os efeitos de quaisquer opióides presentes. A pessoa pode permanecer sem reagir se a xilazina estiver presente. Peça ajuda e faça respirações de resgate para ajudar na respiração.

A Xilazina é um perigo para a saúde

- A xilazina é um **medicamento de ação prolongada e sedante, mas não é um opióide**. Experiências de uso observaram “me fez dormir de forma estranha”; “me deixou fora do ar por 6 horas”; “muito forte”; “me fez desmaiar e acordei com vômito em cima de mim”, “pele em chamas, os dentes pareciam que iam cair”, e “causando buracos (úlceras) onde foram injetados”.
- A xilazina pode causar falta de resposta ou diminuição da consciência, baixo nível de açúcar no sangue, pressão sanguínea baixa, ritmo cardíaco lento, e **respiração reduzida**. Já que a xilazina é frequentemente encontrada em combinação com outros medicamentos sedantes como opióides, há um risco maior de overdose ou morte.
- O uso de xilazina pode aumentar o **risco de úlceras de pele** no local de injeção ou outros cortes. As úlceras de pele da xilazina podem rapidamente levar a infecção ou necrose.
- As pessoas podem apresentar **ferimentos graves** se excederem e não respondem por longos períodos. Quedas; hipotermia ou emergências relacionadas com o calor se for usado de forma externa; e pode resultar em danos a músculos, nervos e rins se o fluxo sanguíneo for restrito a uma parte do corpo por um longo período.



A xilazina foi encontrada em pó e comprimidos para dor.



[Clique](#) ou escaneie para mais informações.

Redução de danos e risco de overdose

- O fornecimento de drogas é imprevisível. É mais seguro usar quando outras pessoas estão presentes ou podem verificar com frequência. As pessoas que usam juntas devem se revezar para evitar overdose simultânea.
- Em caso de overdose, administre naloxona, faça respirações de resgate e acompanhe até que a respiração seja restabelecida, mesmo que a pessoa permaneça sem resposta. Você pode adquirir naloxona em programas de redução de danos e em farmácias de varejo sem receita médica. Se alguém está tendo uma overdose, coloque a pessoa na posição de recuperação, certifique-se de que suas vias aéreas estão desobstruídas e monitore a respiração.
- Use uma seringa esterilizada e limpe o local com um algodão com álcool antes de cada injeção. Monitore os locais de injeção e outros cortes ou arranhões, e procurar atendimento médico em caso de abscessos ou úlceras de pele. Fique alternando os locais de injeção para evitar danos às veias e reduzir o risco de infecção.
- Considere não ficar alternando entre a injeção, cheirar e fumar.
- Entre em contato com um programa local de redução de danos para obter ajuda com abscesso ou tratamento de feridas, maiores orientações sobre uso mais seguro, materiais de uso mais seguro, testes de fentanil, e verificação e drogas com MADDS.

* Todas las muestras fueron provistas por programas de reducción de daños o donadas por el departamento de policía para el análisis de MADDS. MADDS es una colaboración financiada por el estado con investigadores de la Universidad de Brandeis, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, varios departamentos de policía de la ciudad y agencias locales de reducción de daños. Contáctenos en maddsbrandeis@gmail.com maddsbrandeis.com.